VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
4. interní klinika
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

Účinnost dokumentu od: 13.2. 2023
Edukační materiál

POUČENÍ PRO PACIENTY: STACIONÁRNÍ JÍCNOVÁ MANOMETRIE

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Manometrie je vyšetření jícnu, při kterém se zjišťují poruchy motility (hybnosti) jícnu a funkce svěračů. To umožňuje upřesnit, případně stanovit diagnózu a případně další léčbu. Toto vyšetření je rovněž vhodné u pacientů s refluxní chorobou před operací.

Používá se tenká ohebná sonda. Výhodou je získání údajů o tlakových poměrech v jícnu.

Komplikace se vyskytují v cca 1-3% případů a jsou nezávažného charakteru. Jedná se o mírné krvácení z nosu či pohmoždění dutiny nosní. Riziko vážných komplikací (např. proděravění jícnu nebo žaludku) je minimální.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Alternativa této diagnostické metodě není.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Alespoň 6 hodin před vyšetřením nejíst a 3 hodiny nepít. Po dohodě s lékařem je většinou nutné 48 hodin vysadit některé léky, např. Cerucal, MCP Hexal, Motilium, Kinito, Itoprid.

Při zavádění sondy sedíte a sonda se zavádí nosem do jícnu a do žaludku. Po zavedení budete ležet na zádech. Během vyšetření Vám bude opakovaně podáno pomocí stříkačky 5 ml vody, kterou budete na výzvu polykat. Takto bude provedeno měření v celém jícnu.

Celkové vyšetření trvá 15-20 minut, poté je sonda vytažena a vyšetření ukončeno.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Po nekomplikovaném vyšetření můžete opustit ambulanci ihned a jíst a pít bez omezení.

Další potřebná léčba:

Další léčba po vyšetření není nutná. Záznam bude po vyšetření vyhodnocen a výsledek Vám bude předán do 15 minut, eventuálně zaslán Vašemu ošetřujícímu lékaři.