



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: Zadejte celé jméno**r. č.:** Zadejte RČ

Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení): Zadejte celé jméno

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):**EXENTERACE AXILY, BIOPSIE Z AXILY (ODSTRANĚNÍ MÍZNÍCH UZLIN Z PODPAŽÍ)****Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:**

Uzliny z podpaží se odstraňují buď za účelem biopsie (vyšetření vzorku tkáně pro určení rozsahu onemocnění a určení následné léčby) a nebo, pokud již bylo prokázáno poškození mízních uzlin podpaží nádorovým procesem, provádí se odstranění tzv radikální „exenterace“ za účelem vyoperovat co nejvíce mízních uzlin, které již mohou být nádorem poškozené.

Vzhledem k tomu, že mízní systém se spolu s cévami spolupodílí na odvodu tkáňového moku z končetin, nelze vyloučit, že po radikálním odstranění uzlin z podpaží bude horní končetina na stejné straně otékat.

Výkon je obvykle prováděn v celkové anestezii (celkové vyřazení vědomí a vnímání bolesti) poučení provádí anesteziolog (lékař, který celkovou anestezii navozuje a řídí).

V případě, je-li výkon prováděn v místním umrtvení (obvykle pouze biopsie), pak komplikacemi mohou být alergie (nepřiměřená reakce) na znečlivující látku, která může mít projevy místní (vyrážka, svědění), ale celkové, vážné, které v krajním případě mohou vyústit v různé stupně dušení, bezvědomí a při nepříznivém průběhu i v úmrtí pacienta. Alergická reakce může být rovněž na dezinfekci (látka ničící choroboplodné zárodky) či šicí materiál.

Komplikacemi samotného výkonu pak mohou být poranění krevních a lymfatických cév a také nervových svazků, které podpažím probíhají. Následky poranění cévních struktur jsou pak krvácení, které může v krajním případě ohrozit pacienta ztrátou končetiny či vést až k úmrtí při nepříznivém průběhu. Následky poranění nervových struktur mohou být ztráta citlivosti a schopnosti pohybu končetinou částečně či zcela nebo ztráta citlivosti v oblasti zevní strany hrudníku na stejné straně, kde je operace provedena.

Komplikacemi při hojení rány jsou krvácení a vznik hematomu (krevního výronu) v ráně, který se může následně zanítit a dále vzniku tzv abscesu v ráně (hromadění hnisavé tekutiny), což může při nepříznivém průběhu zapříčinit vznik celkové zánětlivé reakce organismu, která může pacienta ohrozit při těžkém průběhu i na životě. V případě, hromadí-li se v ráně pouze čirá tekutina, která sama z rány vytéká, nebo je jí nutno vypustit částečným rozpuštěním rány, hovoříme o tzv seromu (tekutina produkovaná okolními tkáněmi či vzniklá odbarvením krevního výronu v ráně).

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Pouze léčba nádorového onemocnění léky či radioaktivním zářením.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Výkon v místním umrtvení: po přípravě operačního pole dezinfekcí a jeho ohraničením rouškami injekční vpravení znečlivující látky. Poté vyoperování mízní uzliny, která je buď evidentně přeměněná nádorovým procesem a nebo její nalezení na základě nahromadění radioaktivní látky s krátkým poločasem rozpadu (radioaktivní látka, která se velmi brzy vyloučí z těla, obvykle Technecium) v uzlině, kontrola krvácení podvazem cév, elektrokoagulací (uzavření cévy pomocí drobného elektrického výboje) či kompresí (tlakem na krvácející cévu). Následné sešití podkožních tkání



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: Zadejte celé jméno

r. č.: Zadejte RČ

vstřebatelným šicím materiálem a kůže nevstřebatelným šicím materiálem.

Výkon v celkové anestezii: po uvedení do celkové anestezie (viz poučení anesteziologa) je postup stejný jako při místním umrtvení.

Odstranění uzlin radikální:

Po uvedení do celkové anestezie kožní řez podélně v podpaží a na zevní straně hrudníku, postupné vyoperování všech nalezených mizních uzlin a podpažního tuku, zavedení drénu (hadičky) napojeného na aktivní sání, kontrola krvácení a následné sešití podkožních tkání vstřebatelným šicím materiálem a kůže nevstřebatelným šicím materiálem.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Klidový režim vhodný k podpoře hojení operační rány, délka závislá na rozsahu operačního výkonu a velikosti rány. Obvykle 1 - 4 týdny.

Zprvu možná bolest v ráně omezující i pohyb končetiny, především její upažování.

Další potřebná léčba:

Opakované převazy rány obvykle 1x za 5 - 7 dní (v případě komplikací hojení rány uvedených výše eventuální nutnost převazů po 1 - 2 dnech). Je-li zaveden při operaci drén, je nutné jeho odstranění, jestliže přestane odvádět tekutinu).

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uveďte se důvod jejich neposkytnutí:

Zadejte důvod

V Praze dne Zadejte datum

.....
podpis pacienta / zákonného zástupce

.....
jméno, příjmení a podpis lékaře

.....
podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat: Zadejte důvod



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

Formulář | IS-1CHK-094 | strana 3 z 3

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: Zadejte celé jméno	r. č.: Zadejte RČ
Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli: Zadejte způsob	
..... <i>jméno, příjmení a podpis svědka</i>	