

**INFORMOVANÝ SOUHLAS**

Jméno a příjmení:	r. č.:
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): OPERAČNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENINY (OSTEOSYNTÉZA) HORNÍHO KONCE KOSTI LOKETNÍ (ULNY) - ZLOMENINY V OBLASTI OKOVCE (OLECRANONU) ☐ VPRAVO ☐ VLEVO	
Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu: Předpokladem k obnovení plné funkce poraněného loketního skloubení postiženého zlomeninou okovce kosti loketní je zhojení úlomků kosti ve vyhovujícím postavení. V případě, že pro polohu úlomků a charakter zlomeniny není při ošetření sádrovou fixací (znehynění) velká naděje na uspokojivé hojení zlomeniny nebo v průběhu hojení poranění pomocí výše uvedené fixace došlo ke zhoršení postavení úlomků, je indikováno řešení operační. Účelem operace je srovnání úlomků kosti do správného postavení a následné spojení úlomků osteosyntetickým materiálem, dle stavu zlomeny se používají nejčastěji kovové dráty, šrouby či dlahy (destičky s otvory), popřípadě jejich kombinace. O typu použitého materiálu rozhoduje operatér na podkladě charakteru zlomeniny, stavu měkkých tkání v místě zlomeniny a celkového stavu pacienta. Výkon se provádí v celkové či svodné anestezii. Stejně jako každý chirurgický výkon má i tato operace svá rizika. Jedná se například o rozvoj infekce v operační ráně, hojení operační rány keloidní (tuhou, nad povrch kůže vystupující jizvou) krvácení v průběhu operace či po operaci, poškození nervů či cév při operaci. Nemusí dojít ke zhojení osteosyntézou ošetřené zlomeniny, může dojít k selhání osteosyntetického materiálu (většinou jeho rozlomení) či uvolnění tohoto materiálu, který pak může dráždit kožní kryt nebo i vycestovat operační ranou ven. S výkonem se pojí zátěž dávkou rentgenového (ionizujícího) záření, která představuje pouze minimální riziko v porovnání s přínosem diagnostické informace z provedeného vyšetření. Postupy vyšetření jsou nastaveny tak, aby dávka ionizujícího záření byla při dosažení dostatečné diagnostické výtěžnosti co možná nejnižší. Radiační zátěž z vyšetření se tak pohybuje jen v oblasti velmi nízkých dávek. Těhotenství je relativní kontraindikací provedení výkonu, a proto je nutné o případném těhotenství informovat lékaře poskytujícího toto poučení.	
Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: Léčba zlomeniny klíční kosti bez operace konzervativně, většinou sádrovou fixací, která má za cíl fixovat (znehynit) úlomky v uspokojivém postavení. Tento způsob léčby lze ale úspěšně použít jen u určitých zlomenin, jinak je výsledek léčby zpravidla nedobrý. Dochází pak k deformaci v oblasti lokte, bývá výrazně omezena hybnost loketního skloubení, hybnost bývá doprovázena bolestí, často se pak v místě zlomeniny vytvoří paklob, kdy se úlomky kosti k sobě nepřihojí.	
Zdravotní výkon bude probíhat takto: Po domluvě s operatérem a anesteziologem a nutné přípravě k operaci je na operačním sále z řezu v oblasti poraněného lokte proveden uvedený operační výkon. Po operaci je obvykle pacient několik hodin hospitalizován na monitorovaném lůžku dospávacího pokoje, potom se vrací povětšinou na standardní oddělení nebo v případě zdravotních komplikací na jednotku intenzivní péče. Pacient je	



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	r. č.:
následně dle stavu propuštěn do domácí péče většinou několik dnů po operaci.	
Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu: Po operačním výkonu je nutné dodržet klidový režim nejméně 6 týdnů, celková doba rehabilitace může trvat i déle než 3 měsíce. Dle typu použitého osteosyntetického materiálu, jeho tolerance pacientem a celkového stavu poraněné osoby se po zhojení zlomeniny při dalším operačním výkonu odstraňuje při původní operaci použitý kovový materiál. U závažných typů zlomenin oblasti okovce lze očekávat i při správném ošetření zlomeniny dlouhodobé omezení stran plného rozsahu hybnosti poraněného loketního kloubu či mohou přetrvávat bolesti při pohybu.	
Další potřebná léčba: Kontrolní chirurgická vyšetření, rehabilitace poraněné končetiny, dle stavu po zhojení zlomeniny operační odstranění při ošetření použitého kovového materiálu.	
Poznámka: Ženy v reprodukčním věku svým níže uvedeným podpisem vylučují graviditu.	
Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu: V případě, že pacient je nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á: Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše. Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uveďte se důvod jejich neposkytnutí: V Praze dne podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností	
Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat: Důvod, pro nějž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat: Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli: jméno, příjmení a podpis svědka	