VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

ODSTRANĚNÍ ATEROSKLEROTICKÉHO PLÁTU ZE STEHENNÍ TEPNY

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Principem výkonu je odstranění aterosklerotického plátu z tepny v místě, kde působí významné zúžení nebo uzávěr. Cílem je zlepšení prokrvení končetiny, odstranění či zmírnění obtíží nebo zrychlení hojení defektu na končetině.

V případě nástřiku cévy kontrastní látkou se s výkonem pojí zátěž dávkou rentgenového (ionizujícího) záření, která představuje pouze minimální riziko v porovnání s přínosem diagnostické informace z provedeného vyšetření. Postupy vyšetření jsou nastaveny tak, aby dávka ionizujícího záření byla při dosažení dostatečné diagnostické výtěžnosti co možná nejnižší. Radiační zátěž z vyšetření se tak pohybuje jen v oblasti velmi nízkých dávek.

Těhotenství je relativní kontraindikací při užití rentgenového záření, a proto je nutné o případném těhotenství informovat lékaře poskytujícího toto poučení.

Rizikem zdravotního výkonu může být zejména porucha hojení operační rány, její infekce či rozestup, hromadění lymfatické tekutiny s nutností dalšího operačního výkonu, infekce umělého materiálu použitého k plastice s nutností jejího chirurgického odstranění, krvácení z místa sešití tepny, pooperační otok a bolestivost operačních ran, uzávěr tepny v místě operace, amputace.

Mezi obecná rizika operace patří zejména: poranění nervů, cév, krvácení, nutnost krevních převodů, bolest operačních ran, omezení hybnosti, otoky končetin, neurologické komplikace, nežádoucí účinky léčiv, alergické reakce, nežádoucí reakce po podání krevních derivátů, zhoršení stávajících onemocnění (cukrovka, onemocnění ledvin, plic aj.), pooperační infekce (ranné, plicní aj.), srdeční selhání, cévní mozková příhoda, vzácně úmrtí.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Alternativou výkonu je konzervativní terapie (léčba bez operace), jejímž cílem je důsledná sekundární prevence aterosklerózy - užívání léků snižující krevní srážlivost, léků snižující hladinu tuků v krvi, pravidelný trénink chůze. Tato léčba není zatížena možnými komplikacemi spojenými s chirurgickým výkonem, není však účinná u každého pacienta a zúžená místa na tepnách již prakticky neovlivní.

Další alternativou je v indikovaných případech katetrizační ošetření zúžené tepny (roztažení tepny balónkem a zavedení stentu - kovové výztuže). Tento postup je pro pacienta méně zatěžující, výkon lze provést i v místní anestezii s kratší dobou hospitalizace, není však vhodný pro všechny pacienty. Mezi rizika katetrizačního ošetření patří zejména krvácení z místa vpichu, krvácení v místě ošetřované tepny, natržení stěny s průnikem krve do její stěny, časný nebo pozdní uzávěr cévy, vznik falešné výdutě vyžadující časné operační řešení.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Výkon probíhá v kombinované anestezii (viz souhlas s anestezií). Řez Vám bude proveden v třísle. Z postižené tepny bude odstraněn aterosklerotický plát. Při zašívání tepny je možné užití vlastní žíly nebo umělého materiálu k její plastice (rozšíření zúženého místa) V případě užití vlastní žíly je možný pomocný řez na dolní končetině. V některých případech Vám může být přímo na operačním sále provedeno kontrolní angiografické vyšetření (nástřik kontrastní látky do cév a jejich zobrazení rentgenem) k průkazu průchodnosti rekonstrukce.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Pooperačně je možný otok jedné nebo obou končetin, který ve většině případů odezní do několika týdnů. Častým průvodním jevem je bolestivost operační rány, možné jsou pocity brnění či výpadky citlivosti na operované končetině. Doporučujeme pravidelný trénink chůze, dodržování zásad sekundární prevence aterosklerózy - zákaz kouření, kompenzace hladiny cukru v krvi a krevního tlaku. Trvalé užívání léků snižujících krevní srážlivost a hladiny tuků v krvi.

Další potřebná léčba:

Další případné výkony se odvíjejí od pooperačního průběhu a komplikací. Doporučujeme pravidelné kontroly u cévního chirurga, praktického lékaře a kontrolní ultrazvuková vyšetření operované cévy.

Poznámka:

Ženy v reprodukčním věku svým níže uvedeným podpisem vylučují graviditu.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

.....	.....
podpis pacienta / zákonného zástupce	jméno, příjmení a podpis lékaře

.....
podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli:

.....
jméno, příjmení a podpis svědka