VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

CHIRURGICKÝ VÝKON NA CÉVÁCH CHIRURGICKÝM A KATETRIZAČNÍM PŘISTUPEM SE ZOBRAZENÍM CÉV KONTRASTNÍ LÁTKOU (TZV. HYBRIDNÍ VÝKON)

☐ **VPRAVO**
☐ **VLEVO**

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Cílem výkonu je řešení nálezu na tepenném nebo žilním řečišti, a to kombinovaným otevřeným (chirurgickým) a katetrizačním přístupem provedeným v jedné době. Tím je docíleno významného zlepšení průchodnosti cévních rekonstrukcí nebo cév, dále výrazného zkrácení celkové doby hospitalizace, zlepšení výsledků léčby a snížení možných komplikací ve srovnání s prováděním výkonů ve dvou dobách.

S výkonem se pojí zátěž dávkou rentgenového (ionizujícího) záření, která představuje pouze minimální riziko v porovnání s přínosem diagnostické informace z provedeného vyšetření. Postupy vyšetření jsou nastaveny tak, aby dávka ionizujícího záření byla při dosažení dostatečné diagnostické výtěžnosti co možná nejnižší. Radiační zátěž z vyšetření se tak pohybuje jen v oblasti velmi nízkých dávek.

Těhotenství je relativní kontraindikací provedení výkonu, a proto je nutné o případném těhotenství informovat lékaře poskytujícího toto poučení.

Rizikem operačního výkonu je zejména porucha hojení operační rány, infekce operační rány, nahromadění lymfatické tekutiny, otok svalstva bérce vyžadující chirurgický výkon v podobě protnutí kůže na lýtku, opětovný uzávěr operované tepny, amputace končetiny, poranění nervů, cév, krvácení.

V důsledku provedeného chirurgického výkonu může být v pooperačním období nutné podání krevních převodů, může být přítomna bolest operačních ran, omezená hybnost končetin, otoky končetin, mohou se objevit nežádoucí účinky léčiv, alergické reakce a reakce po provedených krevních převodech, může dojít ke zhoršení stávajících onemocnění (cukrovka, onemocnění ledvin, plic aj.), onemocnění zažívacího traktu, může se objevit pooperační infekce (v operační ráně, plicní aj.), srdeční selhání, cévní mozková příhoda, vzácně úmrtí.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Alternativou výkonu je konzervativní terapie (léčba bez operace), jejímž cílem je důsledná sekundární prevence aterosklerózy (kornatění cév), tedy zejména pravidelná dostatečná pohybová aktivita (doporučujeme minimálně 3x týdně 20 minut chůze), zákaz kouření, léčba cukrovky a vysokého krevního tlaku, užívání léků snižující krevní srážlivost, statinů (léky snižující hladinu cholesterolu), event. péče o defekt na dolní končetině. Tato léčba není zatížena možnými komplikacemi spojenými se samotným chirurgickým výkonem, není však účinná u každého pacienta a zúžená místa na tepnách již neovlivní.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**

Další alternativou je katetrizační a chirurgické ošetření postižené cévy ve dvou dobách. Toto je zatíženo větší zátěží pro pacienta, nutností delší hospitalizace a možným zhoršením výsledků doposud provedené léčby.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Výkon probíhá v celkové nebo místní anestezii (podrobně viz souhlas s anestezií). Chirurgický výkon je doplněný o prostou kontrolní angiografii (rentgenové zobrazení stavu cévního systému kontrastní látkou aplikovanou do cévního řečiště pomocí speciálního katétru) nebo rozšířením tepny zavedeným balonkem do místa zúžení, s nebo bez zavedení stentu (speciální kovová výztuha), uzávěr chirurgické rány, hospitalizace na pooperačním nebo standartním oddělení.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Pooperačně je možný otok jedné nebo obou končetin, který ve většině případů odezní do několika týdnů. Častým průvodním jevem je bolestivost operační rány, možné jsou pocity brnění či výpadky citlivosti na operované končetině. Doporučujeme dodržování zásad sekundární prevence aterosklerózy (kornatění cév), tedy zejména pravidelná chůze, léčba cukrovky a vysokého krevního tlaku, trvalé užívání léků snižující srážení krve (acetylsalicylová kyselina) a léků snižujících hladinu krevních tuků, zákaz kouření.

Další potřebná léčba:

Další případné výkony se odvíjejí od pooperačního průběhu a komplikací. Doporučujeme pravidelné kontroly u cévního chirurga, praktického lékaře a kontrolní ultrazvuková vyšetření operované cévy.

Poznámka:

Ženy v reprodukčním věku svým níže uvedeným podpisem vylučují graviditu.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat: Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat: Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli: ..... jméno, příjmení a podpis svědka	