VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

REKONSTRUKCE PROBÍHAJÍCÍ MIMO TYPICKÝ PRŮBĚH CÉV (EXTRAANATOMICKÁ REKONSTRUKCE)

☐ **VPRAVO**
☐ **VLEVO**

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Principem výkonu je přemostění postižených tepen rekonstrukcí vedenou mimo typický průběh cév s cílem zlepšení prokrvení končetiny, odstranění či zmírnění obtíží nebo zrychlení hojení defektu na dolní končetině. K rekonstrukci je nejčastěji užita umělá cévní protéza, vlastní céva nebo allograft (cévní štěp od lidského dárce).

V případě nástřiku cévy kontrastní látkou se s výkonem pojí zátěž dávkou rentgenového (ionizujícího) záření, která představuje pouze minimální riziko v porovnání s přínosem diagnostické informace z provedeného vyšetření. Postupy vyšetření jsou nastaveny tak, aby dávka ionizujícího záření byla při dosažení dostatečné diagnostické výtěžnosti co možná nejnižší. Radiační zátěž z vyšetření se tak pohybuje jen v oblasti velmi nízkých dávek.

Těhotenství je relativní kontraindikací při užití rentgenového záření, a proto je nutné o případném těhotenství informovat lékaře poskytujícího toto poučení.

Rizikem zdravotního výkonu může být zejména porucha hojení operační rány, její infekce, kýla v jizvě, nahromadění lymfatické tekutiny s nutností operačního výkonu, infekce cévní protézy s nutností jejího odstranění, krvácení, pooperační otok a bolestivost operačních ran, uzávěr rekonstrukce, poranění břišních orgánů, amputace, poranění cév a nervů.

V důsledku provedeného chirurgického výkonu může být v pooperačním období nutné podání krevních převodů, může být přítomna bolest operačních ran, omezená hybnost končetin, otoky končetin, mohou se objevit nežádoucí účinky léčiv, alergické reakce a reakce po provedených krevních převodech, může dojít ke zhoršení stávajících onemocnění (cukrovka, onemocnění ledvin, plic aj.), onemocnění zažívacího traktu, může se objevit pooperační infekce (v operační ráně, plicní aj.), srdeční selhání, cévní mozková příhoda, vzácně úmrtí.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Alternativou výkonu je konzervativní terapie (léčba bez operace), jejímž cílem je důsledná sekundární prevence aterosklerózy, tedy zejména léčba rizikových faktorů, kontrola a léčba cukrovky, vysokého krevního tlaku, zákaz kouření, užívání léků snižující krevní srážlivost, statinů (léky snižující hladinu cholesterolu), pravidelný trénink chůze. Tato léčba není zatížena možnými komplikacemi spojenými s chirurgickým výkonem, není však účinná u každého pacienta a zúžená místa na tepnách již neovlivní.

Další alternativou je v určitých případech katetrizační ošetření zúžené tepny (roztažení balónkem a implantace stentu - kovové výztuže). Tento výkon je pro pacienta méně zatěžující, lze jej provést i v místní anestezii s kratší dobou hospitalizace. Mezi rizika katetrizačního ošetření patří

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**

zejména krvácení z místa vpichu, krvácení v místě ošetřované tepny, natržení stěny s krvácením, časný nebo pozdní uzávěr rekonstrukce, vznik falešné výdutě vyžadující časný operační výkon.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Výkon probíhá v kombinované anestezii (viz souhlas s anestezií). Řez Vám bude proveden dle typu výkonu na břiše, pod klíčkem v tříslech na dolních končetinách, na tepny bude našita umělá cévní protéza, vlastní céva nebo štěp od dárce a rány následně zašity. V určitých případech Vám může být přímo na operačním sále provedeno kontrolní angiografické vyšetření (nástřik kontrastní látky do cév a jejich zobrazení rentgenem) k průkazu průchodnosti rekonstrukce.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Pooperačně doporučujeme klidový režim s postupnou zátěží (cca 6 týdnů). Vzhledem k riziku vzniku kýly v jizvě není v tomto období vhodné zvedání těžkých břemen. Pooperačně je možný otok jedné nebo obou končetin, který ve většině případů odezní do několika týdnů. Častým průvodním jevem je bolestivost operačních ran, možné jsou pocity brnění či výpadky citlivosti na operované končetině. Doporučujeme pravidelnou chůzi, dodržování zásad sekundární prevence aterosklerózy - zákaz kouření, kontrola a léčbu cukrovky a vysokého krevního tlaku. Trvalé užívání acetylsalicylové kyseliny eventuálně jiných preparátů snižujících krevní srážlivost a léků snižujících hladinu krevních tuků.

Další potřebná léčba:

Další případné výkony se odvíjejí od pooperačního průběhu a komplikací. Doporučujeme pravidelné kontroly u cévního chirurga, praktického lékaře a kontrolní ultrazvuková vyšetření operované cévy.

Poznámka:

Ženy v reprodukčním věku svým níže uvedeným podpisem vylučují graviditu.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat: Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat: Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli: ..... jméno, příjmení a podpis svědka	