


**INFORMOVANÝ SOUHLAS**

Jméno a příjmení:	r. č.:
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): KONIZACE A CYLINDRICKÁ DISEKCE - OPERACE NA DĚLOŽNÍM ČÍPKU KYRETÁŽ HRDLA DĚLOŽNÍHO <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE KYRETÁŽ TĚLA DĚLOŽNÍHO <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu: Odstranění části děložního čípku (kužele tkáně) a vzorku sliznice z hrdla děložního eventuálně i z dutiny děložní, které budou také mikroskopicky vyšetřeny, aby mohl být posouzen celkový rozsah změn. Bohužel žádný operační zákrok není zcela bez rizika. I přes velkou opatrnost a péči může během operace dojít ke komplikacím, které jsou naštěstí ve velké většině dobře rozpoznatelné a dobře řešitelné. <u>Během operace může dojít:</u> <ul style="list-style-type: none">- k poranění stěny děložní a silnému krvácení s nutností podat krevní převod, výjimečně je nutné zastavit krvácení operačně z řezu na přední stěně břišní nebo laparoskopicky,- výjimečně, zejména při komplikovaném výkonu (obezita, srůsty, anatomické odchyly), může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů - močový měchýř, močová trubice, močovody, tlusté a tenké střevo, nervy); tato poranění mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu nebo i k opakované operaci,- velmi vzácně k otlakům měkkých tkání a obrně nervů, které mohou vzniknout v důsledku polohy při operaci; tyto změny ve většině případů během několika týdnů odezní a málokdy zanechají trvalé následky,- další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy; bližší informace Vám poskytne před operací přímo lékař anesteziolog. <u>Po operaci může dojít k těmto komplikacím:</u> <ul style="list-style-type: none">- zřídka se může objevit pozdní krvácení během 2 týdnů po operaci, které je způsobeno obnažením cév po částečném vyhojení rány,- velmi vzácně se objeví dočasná porucha vyprazdňování močového měchýře a střevních kliček, která pozvolna během několika dnů odezní,- k infekci operační rány, dutiny břišní či močových cest s nutností podat antibiotika,- velmi vzácná je trombóza - vytvoření se krevních sraženin v žilách např. pánevního dna, a "embolie" - zanesení těchto sraženin např. do plic; tam může v krajním případě dojít k uzavření žilního řečiště a smrti.	
Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: Tento výkon nemá alternativu.	
Zdravotní výkon bude probíhat takto: Operace se provádí v krátké celkové anestezii nebo někdy i v místním znecitlivění. Přístup k děložnímu čípku je přes pochvu. Z čípku se vyřízne buď elektrickou kličkou nebo jehlou ložisko změněné tkáně ve tvaru kužele nebo válce (konus, cylinder). Při zákroku se obvykle odeberou vzorky sliznice hrdla děložního, eventuálně i dutiny děložní, které budou také mikroskopicky vyšetřeny, aby mohl být posouzen celkový rozsah změn. Jde o výkon diagnostický, pomocí kterého určíme současný stav onemocnění čípku a zároveň o výkon léčebný, který odstraní postiženou část čípku. Ve velké většině případů je tento výkon dostatečný a není potřeba další operace. V některých případech si nutný rozsah konizace vyžádá nejprve odříznutí úponu pochvy na děložní hrdlo tak, aby se přístup k děložnímu hrdlu zlepšil a mohl být odstraněn dostatečně velký konus. Průběh operace může být digitálně dokumentován a prezentován (fotodokumentace, videozáznam). VFN se zavazuje, že to bude provedeno zcela anonymně, že nebude zaznamenán žádný Váš charakteristický rozpoznávací znak (zejména obličej) a ani na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími identifikačními znaky nebude možná plná identifikace Vaší osoby. <input type="checkbox"/> Souhlasím <input type="checkbox"/> Nesouhlasím s fotodokumentací nebo s videozáznamem.	

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:

r. č.:



Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Předpokládaná doba hospitalizace je 1 den. Hojení čípku trvá obvykle asi šest týdnů a bývá spojeno se zakrvavělým výtokem. Po operaci je nutná rekonvalescence potřebná k plnému vyhojení v trvání šesti týdnů. Během této doby je nutné dodržovat zvýšený hygienický režim a nemít pohlavní styk. Operace nemá vliv na pozdější sexuální život. Operace může mít za následek zúžení kanálu děložního hrdla (kanál vedoucí z dělohy do pochvy), s následným obtížným nebo znemožněným odtokem menstruační krve. Tento stav je nejčastěji nutné řešit dalším zákrokem, při kterém se rozšíří (dilatuje) kanál děložního hrdla.

Konizace může v některých případech (zejména pokud se jedná o opakovaný výkon) zvyšovat riziko neúspěchu těhotenství, tedy potratu či předčasného porodu.

Další potřebná léčba:

Další léčba obvykle není nutná, záleží ale na výsledku vyšetření odebrané tkáně.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

.....
 podpis pacienta / zákonného zástupce

.....
 jméno, příjmení a podpis lékaře

.....
 podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:

.....
 jméno, příjmení a podpis svědka