VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

PLASTIKA MĚKKÉHO PATRA, ČÍPKU A ODSTRANĚNÍ PATROVÝCH MANDLÍ

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Výkon zahrnuje plastickou úpravu měkkého patra (UPPP - uvulupalatofaryngoplastika) včetně chirurgického odstranění obou krčních (patrových) mandlí - tonzilektomie. Operaci předchází ve většině případů vyšetření ve spánkové laboratoři a vyšetření stomatologické. Důvodem k operaci jsou v první řadě neurologicky prokázané a vyšetřené zástavy dechu ve spánku. Tyto zástavy svou četností a délkou musí splňovat kriterium pro onemocnění zástavy dechu ve spánku, syndrom spánkové apnoe. Indikací k zákroku na měkkém patře a patrovém čípku může být i pokus o zmenšení či odstranění chrápání.

Možná rizika:

Možnou velmi řídkou komplikací je časné či pozdní krvácení z operační rány. Větší krvácení, pokud se nepodaří zastavit místními prostředky, si může vyžádat zastavení na operačním sále v celkové anestézii. V případě větší ztráty krve může být nutná krevní transfúze. Zcela ojediněle může vzniknout v krku v operované oblasti a krčních uzlinách zánět. Tato komplikace se léčí podáním antibiotik. Vzácně, zejména při přítomném onemocnění chrupu (např. kaz, paradontóza) může dojít tlakem nebo zaváděním ústního rozvěrače k poranění předních zubů, někdy rtu nebo dásně.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Stejný operační postup ovšem bez vynětí patrových mandlí (např. při jejich malé velikosti, zmenšení, nebo po jejich předchozím chirurgickém vynětí). U syndromu spánkové apnoe lze zmírnit obtíže plastikou patra a patrových oblouků s odstraněním patrových mandlí v případě střední nebo lehčí závažnosti výše uvedeného onemocnění. Těžší formy onemocnění jsou léčeny používáním přetlakové masky, tzv. CPAP, které ordinuje (indikuje) Spánková laboratoř (např. Neurologické kliniky VFN). Prodloužené měkké patro, nízko posazené měkké patro eventuálně objemnou uvulu (čípek) způsobujících obstrukční mechanické obtíže při dýchání lze v některých případech zmenšit laserovým zákrokem v místní anestézii.

Z dlouhodobého pohledu chrápání nemusí být zákrokem odstraněno a jeho intenzita se může s určitým odstupem po zákroku opět zvýšit. Stejně tak nemusí být odstraněny dostatečně zástavy dechu ve spánku.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Operace se provádí v celkové anestézii. V celkové anestézii je nutné udržet rozevření úst pacienta speciálním rozvěračem. Z malého nářezu v předním patrovém oblouku se odstraní celá mandle, krvácení z místa odstranění se staví obvykle bipolární elektrokoagulací (pomocí elektrického proudu). Obdobně se postupuje na druhé straně. Poté se doplní úprava a plastická operace měkkého patra, zkrácení anebo odstranění masivního čípku. Nakonec se plasticky posune sliznice měkkého patra tak, aby došlo k zprostornění a uvolnění dýchacích cest.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Hospitalizace trvá obvykle 5 dní, hojení asi 2 týdny. Po operaci se pravidelně vyskytují různě silné bolesti v dutině ústní, někdy vystřelující do uší, může být zhoršené otevírání úst. Tím může být někdy i významně narušen normální příjem potravy. Bolesti se tlumí analgetiky, výjimečně je nutné podávání tekutin a živin nitrožilně. Po operaci, často až do zhojení, je nutná měkká, kašovitá strava. Po operaci se může vyskytnout

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**

zvýšená teplota, vzácněji horečka. Délka pracovní neschopnosti je obvykle 2-3 týdny. Výjimečně abnormální reaktivitou pacienta je způsobené nadměrné jizvení, s následnými pocity škrábání, pálení při polykání, a suchosti, velmi vzácně možnost průniku tekutin či stravy do nosohltanu a nosu při jídle. Změnu zdravotní způsobilosti nepředpokládáme.

Další potřebná léčba:

Klidový režim, kašovitá nebo měkká, nedráždivá a nedrobivá strava, dostatek tekutin, prevence infekce dutiny ústní a krku. Užívat léky ordinované či doporučené lékařem, dodržování termínů kontrol určených lékařem.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:

.....

jméno, příjmení a podpis svědka