VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

ODSTRANĚNÍ NÁDORU SLINNÉ ŽLÁZY:

☐ **S ODSTRANĚNÍM ČÁSTI PŘÍUŠNÍ SLINNÉ ŽLÁZY**
☐ **S ODSTRANĚNÍM CELÉ PŘÍUŠNÍ SLINNÉ ŽLÁZY (PAROTIDEKTOMIE)**

Operovaná strana:

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:
Jde o chirurgické výkony, při kterých se odstraňuje nádor, cysta příušní žlázy, část žlázy nebo celá příušní slinná žláza. Příušní žláza je umístěna za dolní čelistí, pod a před uchem. Nejběžnějším důvodem k operaci je nádor (nezhoubný, zhoubný, neurčité povahy), méně často chronický zánět, někdy způsobený uzavřením vývodu slinnými kameny. Asi 80% nádorů je nezhoubných, zbytek jsou maligní (zhoubné).

Rizika výkonu:

Příušní žlázou prochází lícní (tvářový) nerv ovládající pohyby obličejových svalů. Tento nerv umožňuje zavírání očí, pohyby rtů, tváře. Ve většině případů může být nádor či příušní žláza odstraněny bez trvalého poškození tvářového nervu, avšak při nepříznivé lokalizaci nemocné tkáně nebo větším rozsahu onemocnění mohou nebo musí být menší větve lícního nervu přerušeny. Většinou jsou ale jen pohmožděny, takže po operaci je přechodně snížená pohyblivost či síla obličejových svalů v určité lokalizaci a časem a rehabilitací se upraví. V ojedinělých případech ale může dojít k obrně celého nervu nebo musí být nerv vědomě odstraněn s postiženou tkání žlázy.

Další možné komplikace zahrnují krvácení a zánět v ráně. Častá je necitlivost ušního lalůčku, v malém procentu případů dochází po operaci k pocení tváře při jídle, které bývá trvalé. Zřídka se objeví slinná píštěl, stav, kdy slina vytéká malým kanálkem v jizvě. Tuto komplikaci lze řešit kompresivními (tlakovými) obvazy nebo operativně. V případě, že je zjištěn zhoubný nádor příušní žlázy, může následovat další zákrok na žláze či krčních uzlinách nebo jiná následná léčba, např. záření. Někdy z různých příčin může vzniknout nápadnější jizva. Tu je možno řešit plastickou operací nebo laserem.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:
Odstranění nádoru slinné žlázy je možné pouze chirurgicky. Alternativou u některých prokázaných zhoubných nádorů je onkologická léčba (radioterapie - záření, chemoterapie).

Zdravotní výkon bude probíhat takto:
Operace probíhá většinou v celkové anestézii. Provádí se buď z řezu nad zduřením ve žláze nebo řezu tvaru Y nebo S při ušním lalůčku směrem dolů na krk. Množství tkáně příušní žlázy, která se odstraňuje při operaci, závisí na povaze a velikosti patologického procesu, který žlázu postihuje.

V případě, že patologický proces postihuje část žlázy ležící na větvení lícního nervu nebo je zapotřebí odstranit povrchový list žlázy nebo jeho část, případně celou slinnou žlázu, je součástí operace ozřejmění lícního nervu, čímž snižujeme riziko jeho poranění. Ke snížení rizika poranění lícního nervu rovněž používáme zvětšovací optiku a elektrostimulaci.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:
Hospitalizace trvá dle rozsahu výkonu 3-7 dnů. Po operaci se může vyskytnout bolest v operační ráně, změny citlivosti ušního lalůčku. Bolesti jsou tlumeny analgetiky. Může se vyskytnout zvýšená teplota nebo

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**

horečka, která si vyžádá podání antibiotik. Drén (podtlakový nebo rukavicový) se v ráně ponechává dva i více dnů. Slouží k odvádění ranných tekutin. Stehy se odstraňují 7-10 den. Pracovní neschopnost v přímé souvislosti s operací bývá 2-3 týdny.
V případě poruchy funkce lícního nervu je indikována rehabilitace.
Změnu zdravotní způsobilosti v důsledku vlastní operace slinné žlázy nepředpokládáme.

Další potřebná léčba:
Klidový režim, prevence vniknutí vody a nečistot na ránu. Je nutné užívat léky ordinované či doporučené lékařem, dodržovat termíny kontrol a převazů určených lékařem. Minimálně půl roku po operaci je potřebné jizvu chránit před účinkem slunečního záření, aby nedošlo k její pigmentaci.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli:

.....

jméno, příjmení a podpis svědka