**VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE**
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111



# INFORMOVANÝ SOUHLAS

| | |
|---|---|
| **Jméno a příjmení:** | **r. č.:** |
| Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení): | |

**Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):**

**MYRINGOTOMIE (PARACENTÉZA)** ☐ **ANO** ☐ **NE**
**TYMPANOSTOMIE (VLOŽENÍ VENTILAČNÍ TRUBIČKY DO BUBÍNKU)** ☐ **ANO** ☐ **NE**

**Operovaná strana:**

**Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:**

Myringotomie (paracentéza) je propíchnutí ušního bubínku speciálním jemným nástrojem. Většinou následuje odsátí patologického středoušního sekretu. Tympanostomie znamená umístění odvětrávací (ventilační) trubičky (gromety) do bubínku. Trubička bývá z titanu nebo umělé hmoty. Ventilační trubička nahrazuje nedostatečnou ventilační a drenážní funkci Eustachovy trubice, slouží tedy k provzdušnění středouší a odvádění patologických tekutin. Eustachova trubice je normální anatomické spojení středoušní dutiny s nosohltanem. Tympanostomie se provádí zejména u vleklého středoušního zánětu s trvalým výpotkem ve středouší. Zavedení trubičky do bubínku je indikováno také k udržení drenáže středouší při silném a komplikovaném akutním zánětu středouší. Trubička zůstává v bubínku obvykle několik měsíců, může se ale vyloučit dříve nebo zůstat na místě i roky. Trubičku je možno v místní nebo celkové anestézii kdykoli odstranit.

Možná rizika:

Paracentéza a tympanostomie jsou naprosto běžné malé ušní zákroky. Jsou mimořádně bezpečné a efektivní. Komplikace jsou vzácné, obvykle jde o infekci a zánět středouší (pokud ten není důvodem k provedení výkonu), který může být léčen antibiotiky. Po paracentéze se někdy objeví krvácení ze zvukovodu, které se obvykle samo zastaví po vložení gázového proužku. Může dojít k poranění zvukovodu s následným krvácením a výjimečné i k poranění sluchových kůstek, zejména třmínku s možností vzniku závratě a zhoršení sluchu. Nebezpečí hrozí zejména při paracentéze prováděné u nedostatečně spolupracujícího a neklidného dítěte (pacienta) při výkonu na ambulanci.

**Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:**

Paracentéza se provádí samostatně zejména u akutních zánětů středního ucha. Její alternativou u běžných akutních zánětů je podávání antibiotik a léků proti bolesti. Nevýhodou tohoto postupu je delší hojení zánětu, delší trvání bolesti a větší riziko komplikací. U těžkých nebo komplikovaných zánětů nemá alternativu.

Zavedení ventilační a drenážní trubičky u vleklých středoušních zánětů se provádí obvykle po vyčerpání možností konzervativní léčby (léky, profuky). Není-li v těchto případech trubička zavedena, nelze obvykle jinak zlepšit sluch a zabránit vzniku trvalých patologických změn ve středouší.

**Zdravotní výkon bude probíhat takto:**

Operace se provádí u dospělých v místní anestézii, kdy se bubínek znecitliví anestetikem aplikovaným obvykle na vatičce na bubínek nebo v celkové anestézii, která je pravidlem u zavedení ventilační trubičky u dětí. Bubínek se protne ušním kopíčkem a odsaje se sekret ze středouší. Zavedení ventilační trubičky ve tvaru špulky se provádí ušním háčkem nebo speciálním nástrojem.

**Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:**

Paracentéza a tympanostomie je u dospělých většinou ambulantním zákrokem, hospitalizace u dětí trvá obvykle 1 den. Po paracentéze pro akutní zánět středouší dochází k výtoku vodnatého, krví zbarveného nebo hnisavého sekretu ze zvukovodu.

**VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE**
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111



# INFORMOVANÝ SOUHLAS

| **Jméno a příjmení:** | **r. č.:** |
|---|---|

Po tympanostomii pro sekretorický katar (zánět) středouší výtok nebývá nebo je malý a trvá 1-2 dny. Déle trvající a hnisavý výtok může být komplikací, je třeba ihned konzultovat lékaře. Tympanostomická trubička zůstává v bubínku obvykle několik měsíců, může se ale vyloučit dříve nebo zůstat na místě i roky. Po odstranění ventilační trubičky z bubínku v ojedinělých případech nedojde ke zhojení bubínku. Přetrvávající proděravení bubínku je potom nutno řešit operací - myringoplastikou. Změnu zdravotní způsobilosti nepředpokládáme.

**Další potřebná léčba:**
Klidový režim, užívat léky ordinované či doporučené lékařem, dodržování termínů kontrol určených lékařem. Po dobu, co je tympanostomická trubička v uchu, je nutné vyvarovat se vniknutí vody a nečistot do ucha.

**Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:**
V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:
**Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.**
Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

..... .....
podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....
podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

**Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat**:
Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:
Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:

.....
jméno, příjmení a podpis svědka