

**INFORMOVANÝ SOUHLAS**

Jméno a příjmení:	r. č.:
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ S PODÁNÍM KONTRASTNÍ LÁTKY SONOVUE	
Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu: SonoVue je mikrobublinová kontrastní látka, která odráží ultrazvukové vlny jinak než tělesné tkáně, takže zlepšuje jejich zobrazení. Toto pomůže lékaři lépe rozpoznat danou část Vašeho těla, cévní zásobení a snadněji nalézt případné abnormality. Stejně jako každý lék, může mít i SonoVue <u>nežádoucí účinky</u> . V klinických studiích byly ojediněle zaznamenány nežádoucí účinky mírné a netrvající dlouho, např. bolesti hlavy, nevolnost, pálení nebo znecitlivění v místě podání injekce. Na našem pracovišti jsme se s nežádoucími účinky nesetkali. Výhodou je, že při vyšetření se neuvžívá rentgenové záření, tedy radiační zátěž je nulová. Snášenlivost kontrastní látky je výborná. Nepříjemnou částí vyšetření může být zavedení kanyly do žíly před podáním kontrastní látky. Při samotné aplikaci již pacienti žádné nepříjemné pocity či bolest neuvádějí. V některých případech (obezita, nepříznivé složení tkání pro průchod ultrazvukových vln, zvýšená plynatost) může být obraz zhoršen a hodnocení vyšetření ztíženo.	
Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: Jiné vyšetření, které by mělo totožnou diagnostickou výtěžnost, toho času není k dispozici. Prosté ultrazvukové vyšetření není často schopno kvalitně zobrazit cévní zásobení a tím i určit druh případného patologického nálezu. Alternativou může být v některých případech rentgenové CT vyšetření (počítačová tomografie) s podáním kontrastní látky, s riziky tomuto vyšetření náležejícími.	
Zdravotní výkon bude probíhat takto: Kontrastnímu vyšetření předchází ultrazvukové vyšetření nativní - bez podání kontrastní látky, při němž si lékař najde přesně místo, které bude vyšetřovat, např. ložisko nejisté povahy v játrech nebo v prsu. Poté je SonoVue podán injekčně do žíly, obvykle na Vaší paži. Obvyklá dávka je 2 nebo 2,5 ml kontrastní látky. Tato dávka může být opakována. Po podání kontrastní látky lékař ultrazvukovým přístrojem sleduje po dobu 5-10 minut cílenou oblast vašeho těla, pořizuje záznam a poté nález zhodnotí. Tím je vyšetření ukončeno.	
Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu: Žádná	
Další potřebná léčba:	



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	r. č.:
Žádná	
Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu: V případě, že pacient je nezletilý/a nebo s omezenou svéprávností a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á: Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše. Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí: V Praze dne podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat: Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat: Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli: jméno, příjmení a podpis svědka	

verze číslo:

platnost od:

tisk: