VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

ORTOGNÁTNÍ OPERACE - POSUNUTÍ BRADOVÉHO VÝBĚŽKU DOLNÍ ČELISTI

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Účelem tohoto výkonu je dosažení harmonického vzhledu obličeje a zlepšení průchodnosti dýchacích cest.

Rizika jsou následující:

Krvácení. Krvácení z úst se objevuje nejčastěji během prvních 24-48 hodin po výkonu. Jedná se většinou o malé krvácení, které se staví pouze přiložením obkladu nebo přidáním stehu na krvácející ránu.

Infekce. Ústa jsou sídlem mnoha mikroorganismů, z nichž některé se při přemnožení mohou stát velmi nebezpečnými. Aby bylo zabráněno infekci operační rány, aplikují se obvykle nitrožilně širokospektrá antibiotika, a to jak v průběhu operace, tak v pooperačním období po dobu cca 1 týdne.

Porucha citlivosti hlavových nervů. Při posunu bradového výběžku dolní čelisti může dojít k poškození třetí (dolní) větve trojklaného nervu. To se projeví následným znecitlivěním dolního rtu. Tento jev se nazývá parestézie. Pokud se tato komplikace vyskytne, ustoupí obvykle do 1 měsíce po výkonu. V některých případech parestézie přetrvává celý život. Je vhodné zdůraznit, že se jedná o subjektivní pocit pacienta; objektivně při pohledu na jeho obličej nelze nic zjistit. Je důležité nezaměňovat citlivost obličeje s hybností, tu zajišťuje lícní nerv, který nelze při výkonu v žádném případě narušit. Návrat k normální citlivosti může trvat i déle (6-8 měsíců).

Další komplikace souvisí s použitím osteosyntetického materiálu, který se používá ke spojení kostí při posunu dolní čelisti. Jedná se o titanové dlahy a titanové šrouby. V některých případech dojde k reakci organismu na tento cizorodý materiál a ten se poté musí odstranit. Nežádoucí reakce se projeví tak, že pacient začne místo zavedení titanového šroubu cítit, místo začne mírně otékat.

Otok. Velikost otoku závisí nejen na typu operace, délce výkonu a chirurgické technice, ale také na individuálních předpokladech pacienta. Po ortognátních operacích je obvyklý značný otok v obličeji, který 3 dny po operaci dosahuje svého maxima. Nenechte se tedy zneklidnit tím, že se v pooperačním období postupně zvětšuje. Tato situace je zcela normální a otok začne za 4-5 dní po operaci ustupovat. K úplnému ústupu dochází většinou po 2-3 týdnech a poté je možné opět se vrátit k normálnímu způsobu života. Otoky se omezují pomocí léků, které se nazývají kortikoidy, aplikovaných do žíly v pravidelných 8 hodinových intervalech 1-2 dny po operaci. Otok může výrazně omezit také obvaz obličeje, který mechanicky stlačuje tváře. Též se pacientům doporučuje otok ledovat a co nejdříve po operaci se pohybovat ve vzpřímené poloze. Existují ještě jiné antiedematozní (proti otoku) léky; jsou to enzymatické přípravky, které však nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Pokud je chcete užívat, je vhodné začít s jejich užíváním až po operaci.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Zvětšení bradového výběžku syntetickým materiálem. Při použití cizorodého materiálu je vyšší riziko jeho odmítnutí organismem.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

V celkové anestezii se provede řez z úst (v oblasti dásně dolní čelisti), obnaží se kost, provede se řez v kosti v oblasti těla dolní čelisti nad bradovým hrbolem. Tím se uvolní bradová část dolní čelisti, která se posune do vyhovujícího postavení, v němž se zafixuje pomocí osteosyntetického materiálu (nitrokostních titanových dlah a šroubů). Nakonec se rány zašijí.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**
způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu: Ortognátní operace přináší pacientovi určitá omezení. Je nutno počítat s tím, že pacient zůstane 4-6 dní v nemocnici. Po operaci je nutná zvýšená péče o hygienu dutiny ústní, výplachy ústními vodami, doporučena je šetřící strava. Po operaci může dlouhodobě nebo trvale dojít k poruše citlivosti obličeje v oblasti brady a dolního rtu.
Další potřebná léčba: Pooperační kontroly v dohodnutých termínech.
Poznámka:
Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu: V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á: **Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.** Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí: V Praze dne ..... podpis pacienta / zákonného zástupce ..... jméno, příjmení a podpis lékaře ..... podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností
Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat: Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat: Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli: ..... jméno, příjmení a podpis svědka