VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČO: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): **CELKOVÁ LÉČBA CYKLOFOSFAMIDEM U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM IMUNITNÍHO SYSTÉMU**	
Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu: Cyklofosfamid (firemní název léku Endoxan) má cytostatické (protibuněčné) a imunosupresivní (potlačující imunitu) účinky. Používá se k léčbě autoimunních kožních onemocnění a k léčbě některých dalších systémových autoimunitních onemocnění. Lék se nesmí užívat při přecitlivělosti na složky přípravku, závažném útlumu krvetvorby, a u neléčených infekcí, včetně infekce močových cest. Větší opatrnost je potřeba u starších pacientů. Lék je pacienty celkově dobře snášen, při tabletové formě léčby jsou většinou nežádoucí účinky mírné. Je to nevolnost, zvracení a prořídnutí vlasů mírného stupně. K pozdním nežádoucím účinkům patří poruchy reprodukčních funkcí a riziko vzniku druhotných nádorových onemocnění. Lék se nesmí podávat v těhotenství.	
Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: Místní léčba, která nemusí přinášet dostatečný léčebný efekt. Jiná celková imunosupresivní (imunitu potlačující) terapie např. pomocí kortikosteroidů, methotrexatu, jejichž nežádoucí účinky mohou být podobné jako při léčbě Cyklofosfamidu. Celková léčba kortikosteroidy má vedle imunosupresivního (imunitu potlačující) vliv i na přerozdělení tělesného tuku - obezita, vzniká typický obézní měsícovitý obličej a velké břicho s relativně tenkými končetinami, zvýšení hodnoty krevního cukru, poškození kůže, problémy spojené s pomalým hojením ran, zvýšení krevního tlaku, žaludeční vředy, osteoporóza a zhrubnutí hlasu.	
Zdravotní výkon bude probíhat takto: Léčba spočívá v pravidelném užívání léku a podrobení se pravidelným kontrolám, které Vám stanoví Váš ošetřující lékař. Průměrná dávka Cyklofosfamidu se pohybuje v rozmezí 50-200 mg denně. V tabletové formě je tento lék součástí některých kombinovaných léčebných režimů. K imunosupresivní (imunitu potlačující) léčbě se doporučuje dávka 50-100 mg denně. Přípravek se užívá asi 1 hodinu před jídlem, nemá se kousat a musí se zapít dostatečným množstvím vody.	
Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu: Pokud užíváte ještě jiné léky, vždy s nimi seznamte svého ošetřujícího lékaře.	

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**

Další potřebná léčba:

Kombinace Cyklofosfamidu a např. místní terapie či jiné celkové terapie, podrobnosti Vám vysvětlí Váš ošetřující lékař.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:

.....

jméno, příjmení a podpis svědka