VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČO: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: Zadejte celé jméno **r. č.:** Zadejte RČ

Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení): Zadejte celé jméno

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

CELKOVÁ LÉČBA CYKLOSPORINEM U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Imunosupresivní léčba potlačuje funkci imunitního systému, proto se užívá v léčbě autoimunitních chorob, kdy imunitní systém napadá vlastní tělo. Při této léčbě dochází k utlumení funkce imunitního systému a ke zklidnění Vašeho onemocnění tzv. remisi (úplné nebo alespoň částečné).

Kdy nesmí být lék nasazen:

Při těžkých onemocněních ledvin a jater, při vysokém krevním tlaku neléčeném nebo obtížně léčebně ovlivnitelném, při závažných infekčních onemocněních současně probíhajících, při nádorovém onemocnění ve Vašem předchorobí. Nesmí se podávat při současné světloléčbě. Dále se nesmí užívat v těhotenství a při kojení a opatrnosti je třeba u osob vyššího věku, u diabetiků, epileptiků a u HIV pozitivních pacientů.

Nežádoucí účinky:

Nežádoucí účinky při imunosupresivní léčbě jsou převážně vázané na dávku léku a obvykle při snížení dávky vymizí. Nejčastěji se setkáme s nevolností, bolestí hlavy, zvýšeným krevním tlakem, bolestmi svalů a kloubů, parestéziemi (mravenčení). Dále se můžeme setkat se zhoršením cukrovky, se zvýšenou hladinou draslíku v krvi nebo naopak se sníženou hladinou hořčíku. Můžete být náchylnější k infekcím. Dále, pokud léčba trvá dlouho (roky), máte vyšší riziko vzniku kožního nádoru, poruchy ledvin či nádorů krvetvorby.

Zakázané léky při imunosupresivní léčbě:

Cyklosporin ovlivňuje nebo je ovlivňován velkým množstvím jiných léků. Některé lékové kombinace mohou způsobit závažné a/nebo život ohrožující stavy (např. bosentan, dabigatran-etexilát, aliskiren). Je proto nezbytně nutné informovat předepisujícího lékaře o všech aktuálně užívaných lécích a upozornit na případné změny v dlouhodobé medikaci.

Zakázány jsou živé vakcíny.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Jinou možností je léčba jiným lékem s imunosupresivními účinky, pokud bude dobře snášen a léčba bude účinná.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Lék je podáván ústy ve formě tablet, tablety užívejte před jídlem a nezapíjejte je grapefruitovým džusem.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Tento lék se podává jen ve specializovaném centru, pacient dodržuje doporučení lékaře a pravidelně dochází na kontroly. Tolerance léčby je individuální. Nepředpokládáme další omezení v obvyklém způsobu života. Pracovní neschopnost doporučuje ošetřující lékař při komplikovaném průběhu nemoci. Při návštěvách u jiných lékařů hlaste, že užíváte lék s imunosupresivním účinkem.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: Zadejte celé jméno **r. č.:** Zadejte RČ

K omezení možné infekce je vhodné se vyhýbat styku s osobami s infekčním onemocněním. V průběhu imunosupresivní léčby není možné očkování živými látkami. Veškerá očkování konzultujte vždy se svým lékařem. Dále není vhodné požívat alkoholické nápoje.

Při léčbě a 3 měsíce po ukončení léčby se nedoporučuje otěhotnět, proto je během léčby nutno volit vhodnou spolehlivou antikoncepci. O vhodné metodě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Je nutné se vyhýbat vyšší expozici slunečnímu (UV) záření, při pobytu na slunci používejte na nekryté části těla krémy s vysokým ochranným faktorem.

Dodržujte pitný režim, ale nepijte třezalkový čaj a omezte přívod solí draslíku, tedy příjem masa a mléka, čerstvé zeleniny a ovoce, hlavně brambor, banánů, meruněk a pomerančů, mají vysoký obsah draslíku. Dále omezte příjem alkoholu a tuků. Je vhodné doplňovat hořčík. Jeho přirozeným zdrojem je především rostlinná strava, jako jsou luštěniny, rýže, ovesné vločky, ořechy, mandle, slunečnicová semínka, ale i čokoláda a některé produkty moře (mušle, krabi).

Další potřebná léčba:

Při léčbě je nutné pravidelně kontrolovat některé biochemické hodnoty a krevní obraz (odběr krve), podpůrná léčba. Další potřebná léčba se odvíjí od závažnosti onemocnění.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

Zadejte důvod

V Praze dne Zadejte datum

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat: Zadejte důvod

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli: Zadejte způsob

.....

jméno, příjmení a podpis svědka