VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

ODSTRANĚNÍ ZBYTNĚLÉ TKÁNĚ PROSTATY PŘÍSTUPEM PŘES MOČOVOU TRUBICI (TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE PROSTATY - TURP)

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Účelem tohoto výkonu je zajistit dobré vyprazdňování močového měchýře, zmenšit objem prostaty a tím předejít možným následkům, jako je další zvětšování prostaty, opakované infekce moče, krvácení z močových cest, vznik kamenů v močovém měchýři nebo vznik výchlipek (divertiklů) močového měchýře, postupné zhoršování močení nebo úplná jeho zástava (retenci), vznik zbytkové moči (rezidua) v močovém měchýři, jeho narůstání, které může vést k městnání v horních močových cestách a až selhání funkce ledvin.

Nástroje se zavádějí močovou trubicí a celý výkon je sledován na obrazovce zavedenou kamerou.

Rizika a důsledky léčby:

- Rizika spojená s anestézií (informace Vám podá odborný lékař anesteziolog).
- Až u 95 % pacientů dochází k retrográdní ejakulaci, místo močovou trubicí navenek se sperma dostává dovnitř do močového měchýře.
- Vznik dočasného nebo trvalého mimovolního úniku moče (inkontinence) u 2-3 % operovaných.
- Vznik zúženiny (striktury) močové trubice či hrdla močového měchýře u 3-4 % operovaných, což může vyžadovat pozdější operační výkon.
- Vznik krvácení při nebo po operaci vyžadující podání transfuze nebo následnou operaci.
- Přechodné ucpání močového měchýře a cévky krevními sraženinami.
- Vznik infekce v moči nebo jinde v těle.
- Močení po odstranění cévky může být přechodně s pocitem pálení/řezání nebo může být častější.
- S odstupem několika dní až týdnů po operaci může dojít k přechodnému krvácení, které si může vynutit nové přijetí do nemocnice nebo operační zákrok.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Sledování průtoku moče a zbytkového objemu moče: to je možné, jen pokud se neobjevují výše uvedené komplikace.

Podávání léků: ke zlepšení potíží, ale i to je možné, jen dokud se neobjeví komplikace, léky mívají obvykle také nežádoucí účinky (pokles krevního tlaku nebo poruchy sexuálních funkcí).

Zavedení cévky do močového měchýře přes močovou trubici nebo podbřišek: v tomto případě je ale nutné cévku pravidelně vyměňovat každých 4-6 týdnů.

Endoskopické naříznutí prostaty (transuretrální incize) přes močovou trubici: to je vhodné jen u menší prostaty. Efekt nemusí být dostatečný, ale sníží se například riziko poruchy ejakulace.

Otevřená operace prostaty znamená řez na podbřišku s odstraněním zbytnělé části prostaty přes močový měchýř: tento postup je vhodný u prostat větších rozměrů, nebo pokud je z močového měchýře potřeba odstranit kámen nebo jeho výchlipku. Má o něco více komplikací a je nutné mít déle cévku na odvod moče.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**

Operace prostaty přes močovou trubici s použitím laseru (jsou různé typy), kde se část zbytnělé tkáně prostaty „vyřeže" nebo „odpaří": výsledek je podobný jako u operace přes močovou trubici. Je nutné mít speciální výkonné přístroje.

Ostatní operace přes močovou trubici na principu radiových vln, tepla, ultrazvuku: obvykle je to méně zatěžující, ale prostata se zmenší podstatně méně. Na přechodnou dobu po operaci může být močení zhoršeno. Je nutné mít speciální přístroje.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Pracovní nástroj s kamerou se přes močovou trubici zavede až do oblasti prostaty a močového měchýře. Po detailním prohlédnutí této oblasti je zbytnělá část prostaty odstraněna resekcí (vnitřním odřezáním). Vznikne tak dutina mezi hrdlem močového měchýře a svěračem. Tato plocha se pak koaguluje (zastaví se krvácení). Na konci operace je přes močovou trubici do močového měchýře zavedena cévka k odvodu moče a vyplachování měchýře od zbytků krvácení. Močová cévka se po několika dnech odstraní.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Na přechodnou dobu může být močení zhoršeno pálením nebo řezáním, možností dočasného nebo trvalého úniku moče s nutností používáním speciálních pomůcek. Pracovní neschopnost bývá několik týdnů v závislosti na závažnosti Vaší práce.

Další potřebná léčba:

Kontrolní vyšetření za 2-3 týdny po operaci a dále pak v několikaměsíčních intervalech sledování vyprazdňování měchýře ultrazvukem, kontrola průtoku moče a případně vyplňování dotazníků.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:

.....

jméno, příjmení a podpis svědka