VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

OTEVŘENÉ ODSTRANĚNÍ MOČOVODU A ČÁSTI MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (URETEREKTOMIE)

☐ **VLEVO**
☐ **VPRAVO**

A PROHLÉDNUTÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (CYSTOSKOPIE)

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Účelem tohoto výkonu je odstranění postiženého močovodu s nádorem, ke zjištění jeho povahy, rozsahu a potvrzení nebo vyloučení zhoubného bujení (rakoviny). V důsledku nádoru mohou vzniknout bolesti, krvácení do moče, a pokud by se jednalo o zhoubný nádor (rakovinu) pak může onemocnění dále postupovat, vzniknout vzdálená ložiska (metastázy) nebo dojít k úmrtí. Nádor může částečně nebo zcela zablokovat odtok moče z ledviny a způsobit její nefunkčnost, případně může dojít ke vzniku infekce v zablokované ledvině. Cílem výkonu je zabránit výše popsaným komplikacím.

Rizika a důsledky léčby:

- Rizika spojená s anestézií (informace Vám podá odborný lékař anesteziolog).
- Poranění větší tepny nebo žíly v pánvi s krvácením.
- Poranění střeva.
- Vzniku infekce v místě operační rány, v moči nebo jinde v těle.
- Možnost snížení kapacity močového měchýře.
- Dočasný únik moče z močového měchýře.
- Možnost dočasného omezení funkčnosti střev nebo jejich nefunkčnost/neprůchodnost.
- Vznik krevní stražení v žilách a jejich vmetnutí do plic (plicní embolie) v pooperačním období.
- Vznik kýly v jizvě.
- Vznik určitého oslabení břišní stěny, projevující se vyklenutím.
- Oblast pod operační jizvou může být citlivá méně nebo zcela necitlivá.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Laparoskopické odstranění močovodu, endoskopická metoda: výhodou je několik menších řezů, případně menší ztráta krve a mírně rychlejší rekonvalescence, ale tato metoda není vhodná pro velké nádory, nebo pacienty s určitými onemocněními (např. závažnými onemocněními srdce nebo plic nebo po rozsáhlých břišních operacích), někdy je nutné operaci během výkonu změnit na otevřenou metodu. Laparoskopie je výkon, při kterém jsou do břišní dutiny zavedeny z několika vpichů operační nástroje a kamera, operatér sleduje televizní obrazovku a pomocí nástrojů, které ovládá mimo břišní dutinu, provede příslušný výkon.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Z řezu na břiše se pronikne k postiženému močovodu, který se postupně uvolní a odstraní, včetně části močového měchýře. Součástí operace může být také odstranění lymfatických (mízních) uzlin (zejména pokud se zjistí před operací nebo během ní, že jsou zvětšené). Po operaci se do místa operace obvykle vloží drén (hadička) k odvodu pooperačního sekretu a krve, který bude za několik dní odstraněn.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**

Odstranění dolní části močovodu je možné také přístupem přes močovou trubici, kde se speciálním nástrojem v močovém měchýři odstraní vyústění močovodu a část močového měchýře. Po operaci bude z močového měchýře odvádět moč na několik dní hadička (močový katétr).

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Na dobu 4-6 týdnů je doporučeno nezvedat těžší břemena, vyvarovat se výraznější fyzické námahy (např. sport, posilovna, práce na zahradě). Pracovní neschopnost nejvíce závisí na závažnosti fyzické práce, kterou vykonáváte, nejčastěji bývá 4-6 týdnů. Je vhodný dostatečný příjem tekutin v množství 2-2,5 litru denně.

Do plného zhojení operační rány a odstranění stehů je vhodné jen sprchování a nedoporučuje se koupání v bazénech nebo koupalištích. Ke změně zdravotní způsobilosti dochází jen výjimečně.

Další potřebná léčba:

Kontrola na urologické ambulanci za několik týdnů, dále pravidelné kontroly k provedení např. rentgenu plic nebo vyšetření jako jsou CT (počítačová tomografie) nebo ultrazvuk, příležitostně krevní odběr ke kontrole funkce zbývající ledviny.

V některých případech bude potřeba doživotního sledování formou pravidelných kontrol močového měchýře kamerou. Při zhoršené funkci zbývající ledviny může být potřeba dodržovat speciální dietu.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:

.....

jméno, příjmení a podpis svědka