INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): **OPERAČNÍ ODSTRANĚNÍ PŘEBYTEČNÉ (ZÁNĚTEM ZVĚTŠENÉ) TKÁNĚ ŠOURKU A PLASTIKA KŮŽE ŠOURKU A KŮŽE PENISU**	

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:
Důvodem k výkonu je neúměrně velké zvětšení objemu tkáně šourku, bolesti a znemožnění močení spontánní cestou, penisem.
Následkem tohoto onemocnění může dojít k dalšímu rozvoji zánětu a růstu objemu šourku s pokračováním poškození tkáně, úplné zástavě močení a zhoršení vyprazdňování močového měchýře s městnáním moče v močovém měchýři a zhoršením funkce ledvin, eventuálně také selhání ledvin s nutností hemodialýzy (umělého očišťování krve).
Zvětšené uzliny mohou blokovat odtok mízy (lymfy) nebo krve z dolní končetiny, což se může projevit vznikem otoku, případně bolestmi části nebo celé končetiny. Blokáda krevních cév může vést k uzávěru žil krevní sraženinou (hluboké žilní trombóze). Sraženina se může sama zčásti uvolnit a dostat se do plic, kde zablokuje tok krve, což může vést k dechovým potížím, poruchám činnosti srdce nebo náhlému úmrtí.
Neúměrné zvětšování objemu šourku může vést k dalším kožním defektům s rizikem místní nebo celkové infekce, rizikem otravy krve (sepse) s možným selháním životně důležitých orgánů a smrtí.
Účelem tohoto výkonu je odstranění nadměrné tkáně šourku a plastika kůže šourku a penisu.
Výkon má následující rizika:

- Rizika spojená s anestézií (informace Vám podá odborný lékař anesteziolog.
- Vznik infekce v moči, v operační ráně, v břiše nebo i jinde v těle (například zápal plic).
- Riziko krvácení ve větší ploše odstraněné tkáně šourku.
- Riziko hluboké žilní trombózy (sražení krve v žilách dolních končetin).
- Riziko poranění varlat eventuálně penisu při operaci.
- Riziko neúměrného jizvení nebo otoku v oblasti zbývajících tkání šourku a penisu.
- V případě potřeby je eventuálně nutná opakovaná operace ke zvládnutí výše uvedených komplikací v operovaném místě.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:
Konzervativní postup: nepodstoupení operace s vědomím přetrvávajícího zvětšení šourku, rizika zánětu, nemožnosti spontánního močení, zmenšování až zanoření penisu do šourku, eventuálně nemožnost pohlavního styku.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:
Pokud není proveden vývod z močového měchýře v podbřišku (epicystostomie), začíná operační výkon zavedením tohoto drénu, trubičky z močového měchýře, kterým po určitou dobu po operaci bude odtékat moč.
Po přetažení předkožky bude vnitřní list předkožky naříznut, celá kůže penisu bude uvolněna až ke kořeni penisu tak, aby bylo zachováno cévní zásobení předkožky. Poté bude provedena tzv. arteficiální erekce, naplněním topořivých těles fyziologickým roztokem. Podle směru zakřivení bude na určených místech naříznuta tzv. tunika (tuhý obal topořivého tělesa), do těchto řezů budou založeny nevstřebatelné stehy tak, aby nebyl uzel po jejich utažení na konci operace hmatný pod kůží. Takových

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**

nářezů tuniky může být několik podle nutnosti a zakřivení penisu (to může být kontrolováno opakovaně během operace tzv. arteficiální erekcí).
V případě, že je penis narovnán vyhovujícím způsobem, je výkon ukončen navrácením kůže penisu do původní polohy, sešitím předkožky a přiložením obvazu. Pokud se pacient dohodne s operujícím lékařem, je možno výkon ukončit, na přání pacienta obřízkou, snesením listů předkožky.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:
Močová cévka, nebo epicystostomie (viz výše) se obvykle ponechává na 1-2 týdny po operaci, či po nezbytně dlouhou dobu podle hojení rány a pooperačního průběhu. Pracovní neschopnost je závislá na typu zaměstnání a hojení.
Zpočátku se vyskytuje ještě otok penisu a šourku, jsou možné opakované převazy operační rány (operačních ran), do odstranění (nebo vypadnutí) stehů (kterými je sešita kůže penisu) by neměl být provozován pohlavní styk ani jiná sexuální aktivita. Po stejnou dobu se někdy podávají léky omezující noční erekce tak, aby se operované tkáně mohly zhojit. Je možné že bude třeba podávání místních léků urychlujících hojení nebo k léčbě místního zánětu.

Další potřebná léčba:
Je nutná pohlavní abstinence do úplného zhojení rány (operačních ran) a odstranění (vypadnutí) stehů. Vzhledem k rozsahu operace se nedoporučuje výraznější fyzická aktivita, včetně sportu, po dobu zhruba 6 týdnů. Do zhojení rány je doporučeno nekoupat se, včetně přírodních koupališť, doporučeno je pouze sprchování. Je doporučeno udržovat pečlivou hygienu šourku a penisu, oblast jizvy je možné jemně krémovat po odstranění stehů (vhodná je např. měsíčková mast). Možné je také oplachování roztokem heřmánkového odvaru nebo jiných léčivých roztoků.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:
V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:
Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.
Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:
V Praze dne

....
podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....
podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:
Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:
Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:

.....
jméno, příjmení a podpis svědka