VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

NOVÉ NAPOJENÍ MOČOVODU NA MOČOVÝ MĚCHÝR (REIMPLANTACE MOČOVODU NEBO TAKÉ UERETEROCYSTONEOANASTOMÓZA) U DÍTĚTE

☐ **VLEVO**
☐ **VPRAVO**
☐ **OBOUSTRANNĚ**

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:
Účelem výkonu je zajistit volný průchod moče močovodem, bez refluxu (zpětného průniku moči do ledvin) a tím předejít komplikacím a zachovat dobrou funkci ledviny. Ponechání vysokostupňového reluxu může způsobit velmi těžké a život ohrožující infekce, sepse, kde hrozí i riziko úmrtí. Dále může dojít k úplné a trvalé ztrátě funkčnosti ledviny a jejímu zmenšení.
Rizika a důsledky léčby:

- Rizika spojená s anestézií (informace Vám podá odborný lékař anesteziolog).
- Vzniku infekce v operační ráně, místě operace nebo jinde v těle.
- Vznik kýly v jizvě po operaci.
- Únik moče z místa operace do těla (urinom) nebo prosakování zevně.
- Možnost zhoršení vyprazdňovací nebo plnící funkce močového měchýře.
- Poranění střeva (jen bude-li otevřena dutina břišní).
- Krvácení s nutností podání krevní transfuze nebo provedení druhé operace.
- Pooperační střevní neprůchodnost na podkladě nečinnosti střev nebo překážky (jen bude-li otevřena dutina břišní).
- I po dlouhé době od operace může dojít ke vzniku srůstů v dutině břišní, které mohou způsobit střevní neprůchodnost (jen bude-li otevřena dutina břišní).
- Riziko zúžení močové trubice, je-li pacient při výkonu cévkován.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:
Pokračovat v antibiotické zajišťovací léčbě, jde o pouhé oddálení řešení. Nebo provést operaci, při níž se cestou močového měchýře zčásti uzavře ústí močovodu bobtnavou látkou aplikovanou pod ústí močovodu. Je to méně vhodné řešení s vyšším rizikem recidivy (návratu) refluxu.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:
Provede se řez v podbřišku a postupně se pronikne k močovému měchýři. Otevře se močový měchýř, ozřejmí se ústí močovodu, obřízne se a močovod se vtáhne v délce cca 5 cm do močového měchýře. V případě, že bude močovod příliš silný, provede se modelace. Na cévce močovod se podélně přehne a sešije. Pak se vytvoří podslizniční tunel na spodině měchýře, kam se protáhne močovod a rovněž se vyšije do dutiny měchýře.
V případě oboustranného výkonu bude obdobně postupováno i na druhé straně. Pak se uzavře měchýř, do močovodu v případě modelace se zavede cévka, kterou se vyvede přes stěnu měchýře a stěnu břišní ven z těla k odvodu moči. Založí se drény (hadičky) do okolí měchýře k odvodu krve a moči. Uzavře se operační rána. Do močového měchýře se zavede cévka přes kůži v

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**

podbřišku(epicystostomie) nebo se ponechá cévka v močové trubici.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Novým napojením močovodu na močový měchýř je možné zlepšit nebo zcela upravit průtok moče a tím předejít komplikacím a trvalému poškození funkce ledviny nebo nutnosti mít zavedenou vnitřní či vnější hadičku. Nedochází ke změně pracovní způsobilosti.

Další potřebná léčba:

Na přechodnou dobu po operaci budete mít zavedenou močovou cévku do močového měchýře na několik dní, dále podle typu operace zavedena hadička do močovodu k odvodu moči z ledviny na dobu do zhojení nových napojení (7-17 dní). 1-5 dní bude dítě umístěno na jednotce intenzivní péče. Do odstranění stehů a úplného zacelení operační rány není vhodné koupání, je doporučeno jen dítě omývat, případně sprchovat. Může být potřeba užívat dočasně antibiotika nebo léky ovlivňující funkci močového měchýře.

Během hospitalizace se postupně odstraní hadičky zavedené jako drény a katétry z močovodů a močového měchýře, bude potřeba provádět opakovaně kultivace moče a krevní odběry (sledování vnitřního prostředí po operaci). Po zhojení bude nutná pravidelná nefrologické a urologické sledování.

Na 4-6 týdnů po operaci není možno provádět větší fyzickou námahu. Ke změně zdravotní způsobilosti obvykle nedochází, jestliže nedojde k závažným komplikacím.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:

.....

jméno, příjmení a podpis svědka