INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

URETROPLASTIKA (REKONSTRUKCE MOČOVÉ TRUBICE) DISTÁLNÍ FORMY HYPOSPÁDIE (ULOŽENA NÍŽE) A PŘÍPADNÁ ORTOPLASTIKA (NAPŘÍMENÍ PENISU) U DÍTĚTE

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Účelem tohoto zdravotního výkonu je vytvořit konečnou část močové trubice a tím zajistit normální průběh močení a ejakulace semene, v případě potřeby napřímit penis a též zlepšit kosmetický vzhled penisu.

Ve většině případů distálních (mírnějších) forem hypospádií jde pouze o estetický problém pro pacienta, v některých případech může později dojít k problémům s oplodněním, problémům se směrováním proudu moče, zakřivení penisu by mohlo vést k obtížím při pohlavním styku.

Výkon má následující rizika:

Časná rizika (celkově do 10%):

- píštěl (kanálek mezi močovou trubicí a kůží penisu),
- zúžení močové trubice,
- rozpad rány s opětným otevřením žaludu a močové trubice,
- nadměrné neestetické jizvení v ráně,
- zánět v ráně či krvácení z rány,
- infekce močových cest.

Pozdní rizika (celkově dalších 10 %):

- pozdní píštěl (kanálek mezi močovou trubicí a kůží penisu),
- zúžení močové trubice,
- divertikl (vakovité rozšíření močové trubice),
- přetrvávající zakřivení penisu.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Konzervativní postup: nepodstoupení operace s vědomím rizika možných následků onemocnění (viz výše).

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Po obříznutí vnitřního listu předkožky bude stažena kůže předkožky s kůží penisu a obnažena močová trubice a tělesa zajišťující erekci.

Napřímení penisu. Provedeme umělou erekci napíchnutím topořivých těles a jejich naplněním fyziologickým roztokem při zaškrcení těles při kořeni penisu. Při přetrvávání významného zakřivení penisu bude provedeno zřasení těles na horní (tedy k zakřivení opačné) straně penisu po nadzdvižení nervověcévního svazku, který po tělesech probíhá.

V případě onlay plastiky bude z předkožky vytnut kožní lalok, který na cévní stopce bude převeden na

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**

přední stranu penisu a zde bude našit na pruh kůže mezi nynějším ústím a vrcholem penisu (ploténku). Močová trubice bude zakryta nadbytek tkáně laloku, dále kůží penisu a žaludem a bude proveden steh obřízky, zbytek kůže předkožky bude odstraněn.

V případě techniky TIP, bude ploténka uprostřed rozříznuta, pak bude ploténka na cévce tubulizována, bude vytvořena nová močová trubice. Ta bude následně překryta tkání dartos z předkožky poté, co bude zbylá kůže předkožky odstraněna, eventuálně do defektu v ploténce umístíme štěp z předkožky.

V případě nedostatku zevní kůže těla penisu bude k překrytí močové trubice použit i zevní list předkožky.

Pokud nebude možné použít žádnou z těchto technik a rekonstruovat penis v jedné době, provedeme výkon ve dvou dobách. V první době si pouze připravíme ploténku z předkožky, kterou po zhojení s odstupem několika měsíců zrekonstruujeme.

K odvodu moče bude založena punkční epicystostomie, bude jehlou napíchnut močový měchýř a do silné jehly bude zaveden drén, cca na 14 dní. Do močové trubice bude zavedena silikonová dlaha.

Pozor:

- O konkrétní metodě rekonstrukce penisu rozhodne operatér až BĚHEM výkonu dle kvality nalezených tkání!!!
- Pro rekonstrukci se používá tkán z předkožky, proto je součástí výkonu obřízka. Vzhled penisu po rekonstrukci odpovídá vzhledu penisu po obřízce!

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Tělesný klid bezprostředně po operaci po dobu do 10-14 dnů do odstranění drenáže močových cest, na lůžku cca týden.

Další potřebná léčba:

V případě nekomplikovaného průběhu stačí pouze běžná péče o ránu, tedy sprchování rány do vypadnutí stehů, promašťování jizvy a prevence úrazu penisu.

V případě komplikací, sondáž nově vytvořené močové trubice (např. v případě TIP plastiky při potížích s močením doma pravidelné kalibrace močové trubice 1x denně po dobu 6-8 týdnů).

Závažnější komplikace si mohou vyžádat další chirurgický výkon po vyzrání jizev, obvykle s odstupem minimálně 9 měsíců.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
V Praze dne ..... podpis pacienta / zákonného zástupce ..... podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností	..... jméno, příjmení a podpis lékaře
Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat: Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat: Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli: ..... jméno, příjmení a podpis svědka	