INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

ZAVEDENÍ KANYLY (PLASTOVÉ HADIČKY) DO TEPNY

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Výkon je prováděn za účelem nepřerušovaného (kontinuálního) přesného měření krevního tlaku u pacientů s velmi nízkým nebo velmi vysokým tlakem nebo jeho závažným kolísáním. Zároveň může kanyla sloužit k odběrům vzorků tepenné krve nepostradatelných při některých onemocněních a stavech. Odpadá nutnost opakovaných vpichů do tepny.

Jako každý invazivní výkon i zavedení kanyly do tepny přináší riziko komplikací, které ale nejsou časté a většinou nejsou závažné:

- V místě vpichu do tepny může dojít ke krvácení. K minimalizaci této komplikace provádí lékař při zavádění manuální kompresi (stlačení) místa vpichu, někdy je nutné přiložení tlakového obvazu.
- Při dlouhodobém zavedení kanyly stoupá riziko infekce v jejím okolí s možným šířením cévním řečištěm stejně, jako je tomu u žilních kanyl. Kanyla je ihned odstraněna.
- Vzácně může dojít k poruše prokrvení končetiny. Kanyla je ihned odstraněna.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Jako alternativa je někdy možné měření krevního tlaku v krátkých časových intervalech neinvazivně (tlakovou manžetou) na horní končetině. Krevní tlak ale nemusí být neinvazivně měřitelný spolehlivě nebo není měřitelný vůbec a mezi měřeními informace chybí. Při měření v krátkých časových intervalech může kromě bolestivosti vzniknout otlak končetiny a při poruchách krevního srážení krvácení do podkoží.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Vlastní výkon je prováděn vleže na zádech. Místo vpichu je dezinfikováno. Nejčastěji je místem kanylace zápěstí, méně často jiné místo paže nebo třísla. Místo kanylace je lékařem voleno podle anatomických poměrů.

Po dezinfekci je provedeno místní znecitlivění kůže a podkoží aplikací léku tenkou injekční jehlou. Po nástupu znecitlivění je tepna napíchnuta jehlou, do které je zaveden vodící drátek. Po tomto drátku je zavedena kanyla (hadička), která je v místně znecitlivění ke kůži upevněna 2 stehy. Místo vpichu je překryto sterilním obvazem.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Po zavedení kanyly je nutné omezit pohyb dané končetiny, ke znehybnění zápěstí se proto někdy používá dlaha. Krátce po zavedení kanyly se mohou objevit nepříjemné pocity související s přítomností cizího tělesa, které zpravidla po krátké době odezní. Doba zavedení kanyly je většinou

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**

do 5 dní.

Další potřebná léčba:

Místo kanylace je pravidelně ošetřováno dezinfekcí a sterilním krytím. Kanyla je napojena na systém pro měření krevního tlaku a je trvale proplachována sterilním roztokem, který zabraňuje sražení krve.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

.....	.....
podpis pacienta / zákonného zástupce	*jméno, příjmení a podpis lékaře*

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli:

.....

jméno, příjmení a podpis svědka