INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: Zadejte celé jméno **r. č.:** Zadejte RČ

Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení): Zadejte celé jméno

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

PUNKCE KLOUBU

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Punkcí kloubu se získává kloubní tekutina, která se dále vyšetřuje laboratorními metodami. Punkcí kloubu a odsátím tekutiny se také zmírňuje napětí v kloubním prostoru, má tedy i léčebný účinek. V některých případech mohou být léky podávány přímo do kloubu, takto podaný lék má rychlejší nástup účinku.

Výkon spočívá v zavedení jehly do kloubního pouzdra. Pokud není použito místních znecitlivujících prostředků nebo celkové anestézie (narkózy), je výkon provázen mírnou až střední bolestí.

Jako každý invazivní výkon i punkce kloubu přináší možná rizika, která ale nejsou častá.

Mezi uvedené komplikace řadíme:

- Alergická reakce na dezinfekci nebo místně znecitlivující látku.
- Krátkodobá bolestivost v místě vpichu.
- Krvácení z místa vpichu nebo do kloubu, převážně při některých onemocněních krvetvorby či poruchách srážlivosti.
- Zanesení infekce do kloubu.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Kloubní tekutina se dá získat jen vstupem do kloubu. Místo jehly lze kloubní dutinu otevřít klasicky chirurgickou operací. Jedná se o mnohem větší výkon spojený s větším rizikem komplikací.

Léky lze podávat ústy, injekcemi do žíly nebo svalu, nebo místně na kůži kolem kloubu.

Výhoda kloubní punkce je v jednoduchosti a krátkosti výkonu. Podaný lék přímo do kloubu má cílenější a rychlejší účinek.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Vlastní výkon se provádí vleže nebo vsedě. Po dezinfekci je provedeno místní znecitlivění kůže a podkoží aplikací léku přes vpich tenkou injekční jehlou. Po nástupu znecitlivění je punkční jehlou přes kůži, podkoží, okolokloubními struktury napíchnuto kloubní pouzdro. Zavedení punkční jehly může být provázeno krátkým píchnutím či tlakem, na který vás lékař upozorní.

Následně je odsáta kloubní tekutina do stříkačky. V případě potřeby mohou být stejnou jehlou podány do kloubního pouzdra léky. Po odebrání kloubní tekutiny nebo po aplikaci léků je jehla odstraněna. Po aplikaci léku do kloubu je kloub rozhýbán, aby se lék dostal do všech záhybů kloubního pouzdra. Místo vpichu se překryje sterilním krytím a přelepí náplastí. Výkon trvá 5 - 10 minut.

U malých dětí je výkon prováděn z důvodu snížení bolestivosti výkonu v celkové anestézii nebo analgosedaci. Nejčastěji se používá inhalace Entonoxu.

Tento typ analgosedace vyžaduje spolupráci pacienta. Před plánovaným výkonem se doporučuje 3 hodiny nejíst. Těsně před výkonem je pacient požádán, aby vdechoval za pomoci náustku nebo

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: Zadejte celé jméno **r. č.:** Zadejte RČ

masky plynnou směs kyslíku a rajského plynu. Tato směs navodí stav celkového obluzení (bez ztráty vědomí) a snížení vnímání bolesti s následnou amnézií na výkon. To znamená, že dítě si nebude pamatovat žádný nepříjemný zážitek. Plyn působí pouze po dobu, kdy je vdechován. Po skončení výkonu je z těla velmi rychle vyloučen. Dítě zůstává na oddělení po dobu minimálně 30 minut pro skončení výkonu.

U starších spolupracujících dětí a u adolescentů se může použít místní znecitlivění za použití krému nebo náplasti EMLA.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Vyšetření pacienta výrazně neomezuje a není důvodem k pracovní neschopnosti.

Po punkci kloubu je doporučení nezatěžovat kloub alespoň 24 hodin (v případě kloubu dolní končetiny klid na lůžku – nechodit). V den vyšetření je nutno nechat místo vpichu zalepené, nekoupat se ve vaně, pouze sprchovat. Obvaz nesmí přijít do styku s vodou. Po dobu 1 týdne doporučujeme omezení zátěže příslušné končetiny (nesportovat).

Další potřebná léčba:

V případě náhlého zhoršení bolesti nebo otoku ošetřeného kloubu je doporučena kontrola neprodleně. U dítěte, u kterého byla podaná celková anestézie nebo analgosedace, je sledováno na lůžkovém oddělení.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

Zadejte důvod

V Praze dne Zadejte datum

....

podpis pacienta / zákonného zástupce *jméno, příjmení a podpis lékaře*

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat: Zadejte důvod

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli: Zadejte způsob

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: Zadejte celé jméno	**r. č.:** Zadejte RČ
..... *jméno, příjmení a podpis svědka*	

verze číslo: Zadejte číslo platnost od: Zadejte datum. tisk: Doplňte