**VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE**
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111



# INFORMOVANÝ SOUHLAS

| | |
|---|---|
| **Jméno a příjmení:** Zadejte celé jméno | **r. č.:** Zadejte RČ |
| Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení): Zadejte celé jméno | |

**Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):**

**TRACHEOSTOMIE (TRACHEOTOMIE)**
**OTEVŘENÍ PŘÍSTUPU DO PRŮDUŠNICE A ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST**

**Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:**

Tracheotomie je chirurgické otevření průdušnice v dolní části krku nad hrudní kostí.

Tracheotomie umožňuje dýchání v případech, když poměry v hrtanu nebo hltanu znemožňují normální dýchání zúžením či uzavřením dýchacích cest otokem, zánětem, nádorem nebo tlakem z okolí, nebo hrozí, že by k uzavření dýchacích cest z podobných příčin mohlo náhle dojít.

Tracheotomie se prování jednak jako neodkladný výkon při ohrožení života, častěji jako výkon preventivní či plánovaný. Provádí se také u dlouhodobě intubovaných pacientů (pacienti se zavedenou rourkou do průdušnice přes dutinu ústní nebo nosní) na umělé plicní ventilaci. Tracheostomie umožňuje dostatečný přívod vzduchu do plic, zlepšuje se čištění dolních dýchacích cest a předchází se poškození hrtanu dlouhodobým umístěním intubační rourky.

Výkon spočívá v zavedení kanyly do průdušnice přes řez kůží, podkožím a průdušnicí. Výkon se provádí v celkové anestezii, někdy je nutné provést výkon v místním znecitlivění.

Tracheostomii je možno zrušit tehdy, dovolují-li to anatomické poměry na dýchacích cestách a pomine-li důvod, proč byla tracheotomie provedena. Zavedení kanyly u tracheostomie může být otázkou dnů, ale i měsíců nebo celého dalšího života.

Jako každý invazivní výkon i tracheostomie přináší možná rizika, ale nejsou častá.

Mezi uvedené komplikace řadíme:

- Alergická reakce na místně znecitlivující látku.
- Krvácení z rány, převážně při některých onemocněních krvetvorby či poruchách srážlivosti, které si může vyžádat chirurgické ošetření.
- Infekce a zánět v okolí rány.
- Nahromadění vzduchu v okolí rány.
- Postižení funkce hlasivek.
- Vytvoření píštěle do jícnu.
- Zúžení průdušnice.

**Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:**

Výkon nemá alternativu, je jediným možným způsobem léčení.

**Zdravotní výkon bude probíhat takto:**

Výkon se provádí vleže na zádech. Po nástupu celkové anestezie se místo výkonu odezinfikuje a zarouškuje. Pokud se výkon provádí v místním znecitlivění, provede se vpichem tenkou injekční jehlou do kůže a podkoží a aplikuje se znecitlivující lék. Poté se provede řez kůže a podkoží v délce 5 – 6 cm a poté řez průdušnicí a zavede se do vzniklého otvoru kanyla. Okraje kožního řezu se mohou sblížit stehy. Výkon je ukončen fixací kanyly pomocí tkaničky přivázané okolo krku a překrytím místa zavedení sterilním krytím.

**Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:**

Délka hospitalizace je určena především povahou základního onemocnění.

# INFORMOVANÝ SOUHLAS

**Jméno a příjmení:** Zadejte celé jméno **r. č.:** Zadejte RČ

Po zavedení kanyly se mohou objevit nepříjemné pocity související s přítomností cizího tělesa, obtíže s polykáním a může kanyla dráždit ke kašli, tyto obtíže jsou obvykle přechodné.
Rána na krku z počátku prosakuje sekretem, kanál trachoestomatu se hojí obvykle 14 dní, stehy se odstraňují 8 – 10 den.
Po operaci dočasně pacient nemůže mluvit. Je-li v pořádku hlasové ústrojí hrtanu, není-li potřeba umělá plicní ventilace a předpokládá se dlouhodobé zavedení kanyly, může pacient po zhojení místa používat fonační (mluvící kanylu), která umožňuje mluvit. Při mluvení se musí uzavírat zevní ústí kanyly prstem.
Odstranění kanyly je možné, jakmile pomine důvod, pro který byla zavedena. Po odstranění kanyly se ve většině případů tracheotomie během dnů či týdnu sama uzavře a zhojí se více či méně nápadně vtaženou jizvou na krku. Nedojde-li k samovolnému uzavření kanálu, provede se uzavření operačním řešením.
Pracovní neschopnost většinou trvá nejméně do zhojení rány po tracheotomii a do uzavření dýchacích cest. Změny zdravotní způsobilosti předpokládáme při trvalém zavedení kanyly.

**Další potřebná léčba:**
Doporučujeme klidový režim, měkčí stravu a opatrné polykání. Pokud pacient s kanylou odchází domů, je třeba zabránit vniknutí cizího tělesa a vody do kanyly a krčního otvoru průdušnice. Kovové kanyly je nutné pravidelně denně vyměňovat a pečlivě čistit.
Je nutné užívat léky a dodržovat termíny kontrol a převazů určených lékařem.

**Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:**
V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:
**Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.**
Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:
Zadejte důvod

V Praze dne Zadejte datum

.....
*podpis pacienta / zákonného zástupce*

.....
*jméno, příjmení a podpis lékaře*

.....
*podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností*

**Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat**:
Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat: Zadejte důvod
Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli: Zadejte způsob

.....
*jméno, příjmení a podpis svědka*

# INFORMOVANÝ SOUHLAS

verze číslo: Zadejte číslo platnost od: Zadejte datum. tisk: Doplňte