



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE, U NEMOCNICE 499/2, 128 08 PRAHA 2, IČO 00064165; TEL.: 224 961 111

INDIKAČNÍ LIST – REGN-COV2

PŘEHLED INDIKAČNÍCH KRITÉRIÍ
JE UVEDEN NA DALŠÍ STRANĚ

INDIKUJÍCÍ LÉKAŘ

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL

PRACOVISTĚ

TELEFON

EMAIL

IČP

PACIENT

☐ Ambulantní☐ Hospitalizovaný (z jiného důvodu než covid-19)

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL

ČÍSLO POJIŠTĚNCE

ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNAPacient je SARS-CoV-2
pozitivní?

ANO



NE

Délka příznaků (jsou-li přítomny)
covid-19 je 10 dní a méně?

ANO



NE

Pacient je starší 12 let
a váží alespoň 40 kg

ANO



NE

Pacient vyžaduje hospitalizaci
pro covid-19

ANO



NE

Klinický stav pacienta vyžaduje léčebné
podávání kyslíku pro covid-19

ANO



NE

Dlouhodobá prognóza
pacienta je příznivá

ANO



NE

Pacient je plně očkovaný (tj. alespoň 14 dnů
od ukončeného základního očkovacího
schématu)

ANO



NE

III. dávka očkování



ANO



NE

Datum očkování II. dávky

Datum očkování III. dávky

DŮVOD
PRO PODÁNÍ
REGN-COV2:

Léčba pacientů ve vysokém riziku progresu do závažného stavu (dávka 1200 mg)



Postexpozici profylaxe u pacientů ve vysokém riziku progresu do závažného stavu (1200 mg)

DALŠÍ KRITÉRIA

☐ index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 35 kg/m²☐ věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:☐ chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)☐ kardiovaskulární onemocnění☐ chronické onemocnění jater☐ hypertenze☐ diabetes mellitus☐ chronické respirační onemocnění☐ primární nebo sekundární imunodeficit☐ index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 30 kg/m²☐ imunosupresivní léčba☐ věk 12-17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:☐ chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci☐ BMI s 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů☐ onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění
s aktuálně probíhající léčbou☐ srpkovitá anémie☐ trombofilní stav v dispenzární péči☐ vrozené nebo získané onemocnění srdce☐ neurologická onemocnění ovlivňující dýchání☐ neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna☐ stav po transplantaci solidního orgánu
nebo transplantaci kostní dřeně☐ zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu,
např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci
(nesouvisející s onemocněním covid-19)☐ věk > 65 let☐ astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující
každodenní podání léků☐ Jiný závažný rizikový faktor – vyplňte prosím

Datum indikace

Datum podání

Pracoviště

Razítko pracoviště a podpis lékaře

Lékař

IČP

Razítko pracoviště a podpis lékaře



INDIKAČNÍ KRITÉRIA – REGN-COV2 (Casirivimab and Imdevimab)

Léčivý přípravek REGN-COV2 je určen pro **léčebné použití a postexpoziciční profylaxi** pacientů po úzkém kontaktu s infikovanou osobou SARS-CoV-2:

Léčba pacientů ve vysokém riziku progresse do závažného stavu splňující následující kritéria:

- dospělí a děti starší 12 let, s tělesnou hmotností alespoň 40 kg,
- pozitivita testu (antigen, PCR) na SARS-CoV-2, doba trvání případných klinických příznaků nepřesahuje deset dní,
- dlouhodobá prognóza je vyhodnocena jako příznivá,
- klinický stav pacienta je v souvislosti s onemocněním covid-19 posouzen jako nevyžadující hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku z důvodu onemocnění covid-19,
- u pacienta existuje vysoké riziko zhoršení klinického stavu (na základě posouzení indikujícím lékařem), indikační riziková kritéria viz dále.

Indikační kritéria pro stanovení míry rizika progresse:

Charakteristika pacienta s vysokým rizikem zahrnuje alespoň některé z následujících kritérií:

- index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 35 kg/m²,
- chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob),
- chronické onemocnění jater,
- diabetes mellitus,
- primární nebo sekundární imunodeficit,
- imunosupresivní léčba,
- chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe),
- onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou,
- trombofilní stav v dispenzární péči,
- neurologická onemocnění ovlivňující dýchání,
- stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,
- věk > 65 let,
- věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
 - kardiovaskulární onemocnění,
 - hypertenze,
 - chronické respirační onemocnění,
 - index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 30 kg/m²,
- věk 12-17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
 - BMI s 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů,
 - srpkovitá anémie,
 - vrozené nebo získané onemocnění srdce,
 - neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna,
 - zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19),
 - astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků,
- jiné individuální rizikové faktory progresse covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu

Postexpoziciční profylaxe u osob vystavených riziku nákazy a splňují současně následující kritéria:

- osoby nebyly plně očkovány (alespoň 14 dnů od ukončení základního očkovacího schématu) nebo lze předpokládat, že po kompletní vakcinaci nedosáhly plné imunitní odpovědi (např. se jedná o imunokompromitované osoby nebo pacienty užívající imunosupresivní medikaci),
 - byly vystaveny úzkému kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 v některé z těchto situací:
 - ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu více než 15 minut,
 - přímým fyzickým kontaktem (např. objímání, líbání),
 - jídlem či pitím ze společného nádobí nebo společně použitým náčiním,
 - expozicí respiračním kapénkám či aerosolu infikované osoby (např. kýchání, kašel),
 - v pobytovém zařízení (např. v domově seniorů, ve vězení), kde se v blízkosti (na stejném oddělení či úseku) vyskytla infikovaná osoba,
 - v lůžkovém zdravotnickém zařízení (včetně lůžek následné péče) v případě pobytu na stejném pokoji s infikovanou osobou,
- splňují následující kritéria:
 - dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg,
 - do 4 dnů od posledního kontaktu,
 - dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá,
 - vysoké riziko progresse do závažné formy onemocnění covid-19 nebo hospitalizace dle výše uvedených rizikových kritérií.

Dávkování

Doporučená dávka je 1200 mg (600 mg kasirivimabu a 600 mg imdevimabu, které jsou podány jako společná jednorázová 30 minutová intravenózní infuze).

V případě trvání expozice viru lze podání REGN-COV2 opakovat za 4 týdny v poloviční dávce (tj. 300 mg kasirivimabu a 300 mg imdevimabu).